

COGR

Gebruiksaanwijzing

Meer opbrengst!

Betere doorworteling!

Ideaal in transport!



CANNA
The solution for growth and bloom




Na jaren onderzoek komt CANNA met een nieuw revolutionair kokos product : CANNA COGR. Het product bestaat uit een uitgekiende mix van kokosgruis, kokosvezel en kokos granulaat. Dankzij de grove kokostructuur heeft COGR de unieke eigenschap om gelijktijdig grote hoeveelheden, voedingsstoffen, vocht en lucht op te nemen en het direct beschikbaar te stellen aan de plant. Dit maakt het medium superieur aan alle andere groeimedia, wat resulteert in snellere doorworteling en hogere opbrengsten! Volg de hieronder gepresenteerde aanwijzingen zorgvuldig op en overtuig uzelf van de kwaliteiten van dit professionele kwaliteitsproduct.

CANNA
The solution for growth and bloom


Gebruiksaanwijzing voor CANNA COGR



- COGR boards worden geperst en droog geleverd, daarvoor is het gemakkelijk in transport en opslag, zie (1).
- Om er een geschikt kweekmedium van te maken moeten de COGR boards eerst met een speciaal hiervoor ontwikkelde COGR BUFFER AGENT geweekt en gebufferd worden. De boards zullen opzwellen van 3 liter naar 17 liter kwaliteits substraat, zie (2).



- Verdun de BUFFER AGENT met water in de verhouding 1:500 en breng de pH op 5,5 - 5,8.
- Voeg per COGR board 12,5 liter verdunde buffer vloeistof toe, bijvoorbeeld met een gieter of slang, zie (3).
- Maak drainsneden vóór of na het toedienen van BUFFER AGENT, afhankelijk van uw systeem, zie (4).
- Laat de COGR met de BUFFER AGENT 24 uur rusten en bufferen. Laat het overtollige vocht uit de mat lopen en breng de plantgaten aan, zie (5).



- COGR is nu klaar om beplant te worden, zie (1).
- Zodra de stekken staan wordt aanbevolen om RHIZOTONIC te gebruiken. RHIZOTONIC stimuleert wortelgroei en de doorworteling van het substraat.



- De planten slaan sneller aan, wat resulteert in een productievere plant. RHIZOTONIC kan worden toegediend via bladbespuiting, met een gieter of met het druppelsysteem, zie (2).
- Start met COGR VEGA met een EC van 1,5 mS/cm². pH 5,5 - 5,8. Zie (3).
 - Zijn de planten goed doorworteld, voer dan de EC op tot een dosering van 1:250. Aanbevolen EC: 1,8 - 2,4 mS/cm², afhankelijk van de kwaliteit en de EC van het water.

Hergebruik:

- COGR kan vanwege zijn stevige structuur uitstekend 3 maal hergebruikt worden zonder kwaliteitsverlies.
- Oogst de plant en verwijder de bovengrondse plantresten, zie (1).
 - Spoel het COGR granulaat grondig door met een dubbele dosis CANNAZYM, en laat het 24 uur rusten, zie (2).
 - BUFFER AGENT is nu niet meer nodig, je kunt direct opnieuw beginnen met aanplanten, zie (3).

Watergift:

- Richtlijn watergift voor volwassen planten is 4 - 6 liter/m² per dag. Aanbevolen aantal druppelbeurten is 1 tot 3 keer per dag. Druppel bij voorkeur alleen overdag wanneer de lampen aan zijn. Zorg voor een voldoende drainage (10 - 20%). Bij zout leidingwater (EC >0,6 mS/cm²) moet er meer worden gedraineerd om zoutophoping te voorkomen.



- Gebruik COGR VEGA tot en met de eerste 2-3 weken van de bloeiperiode (12 uur licht/donker). Op het moment dat de groei stagneert en de bloemvorming begint, is het tijd om over te stappen op COGR FLORES (verdunding 1:250; EC 1,8 - 2,7 mS/cm²; pH 5,5 - 5,8). Zie (1).
- Tijdens de bloei heeft de plant meer behoefte aan fosfaat en kalium. Aan deze behoefte kan worden voldaan door 4 weken voor de oogst, gedurende een week, PK 13/14 toe te dienen. In combinatie met CANNABOOST resulteert dit in nog dikkere en hardere vruchten, dus extra opbrengst, zie (2).
- Stop een week voor de oogst met COGR FLORES.



-TIPS-

- Wanneer wordt gekweekt in plantbakken met een afsluitbaar drainsysteem dan is het gemakkelijker om te beginnen met drainsneden, de COGR om te draaien en vervolgens de plantcontainer vol met bufferoplossing te laten lopen.
- Vanaf tweede week nadat planten op COGR staan wordt het aanbevolen om CANNAZYM met de voeding mee te geven. CANNAZYM breekt dode wortels af, zorgt voor meer lucht in de slab, voorkomt plantziektes, stimuleert het microleven in de bodem en maakt extra voedingsstoffen beschikbaar voor de wortels. CANNAZYM kan continu worden meegegeven met de voeding (verdunding 1 : 400) of een keer per week (verdunding (1:100)). CANNAZYM zorgt er tevens voor dat de COGR beter hergebruikt kan worden.